

La flora



[1]

Il settore settentrionale è costituito da zone umide permanenti circondate da boschi igrofilo a prevalenza di Ontano nero ([Alnus glutinosa](#) [2]) e con altre specie igrofile tipiche della selva planiziaria quali il Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*) ed il Pioppo bianco ([Populus alba](#) [3]).

La zona meridionale è costituita da ampie depressioni interdunali con vegetazione erbacea dove le piante assumono frequentemente "abito" succulento nei fusti e nelle foglie.

È il regno delle Chenopodiacee (generi *Salicornia*, [Arthrocnemum](#) [4], *Salsola*), delle varie specie di giunchi (*Juncus acutus* e *Juncus maritimus*) e dello Statice ([Limonium sp.](#) [5]).

Al margine della fascia litoranea si sviluppa il canneto a [Phragmites australis](#) [6] ed una fascia più ristretta a Canna di ravenna (*Erianthus ravennae*) riconoscibile per le infiorescenze a pannocchia "tipo piuma".

La vegetazione sull'arenile, compromessa da fenomeni erosivi, conta una sporadica presenza dell'Agropiro (*Agropyron junceum*) rendendo visibile solo le "facies" corrispondenti alla duna ed al retroduna con insediamenti di Sparto pungente (*Ammophyla arenaria*).

La fascia al riparo della duna è caratterizzata dall'*Helichrysum stoechas*, composta a fiori gialli basso-cespugliosa.

Source URL: <http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/lame-di-fuori-la-flora>

Links:

[1] <http://www.zoneumidetoscane.it/sites/default/files/Componenti/imglame2.jpg>

- [2] <http://www.zoneumidetoscane.it/it/ontano-nero>
- [3] <http://www.zoneumidetoscane.it/it/pioppo-bianco-gattice>
- [4] <http://www.zoneumidetoscane.it/it/salicornia-glauca>
- [5] <http://www.zoneumidetoscane.it/it/limonio-comune-statice>
- [6] <http://www.zoneumidetoscane.it/it/cannuccia-di-palude>